

The effect of adding of *Nigella sativa* and coriander seeds to the diet of Ghiljai lambs on performance and blood metabolites

Wahidullah Charkhi^{1*}, Fardin Hozhabri², Shir Agha hamidi³,
Hazhir Beheshtizadeh⁴

¹Assistant Professor, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Baghlan University, Afghanistan

²Associate Professor, Department of Animal Sciences, Faculty of Agricultural Sciences and Engineering, Razi University, Iran

³Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Baghlan University, Afghanistan

⁴Researcher Post PhD. Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agricultural Sciences and Engineering, Razi University, Iran

Article Info

ABSTRACT

Article type:

Research Full Paper

Article history:

Received:

Revised:

Accepted:

Keywords:

Aspartate
aminotransferase
enzyme
Daily weight gain
Dry matter intake
Glucose

Background and objective: Medicinal plants are the most important herbal additives known in the ration of ruminant animals. Beneficial effects of using medicinal plants in animal nutrition have been observed through improving feed intake, digestibility and nutrient metabolism, and using medicinal plants in animal nutrition is an easier and more sustainable alternative than artificial sources. The object of the present study is to investigate the effect of adding a mixture of medicinal plants of black seed and coriander with different ratios to the diet of Ghiljai lambs breed on performance, haematology, biochemical metabolites and liver enzymes.

Materials and methods: Twenty-one male Ghiljai lambs with an average weight of 15.55 ± 0.89 kg (90 ± 8 days) were divided into 3 groups of 7 in a completely random design and kept in individual pens (coop) for 40 days. Experimental groups included: 1- control (basal diet), 2- basal diet + 20 g of black seed powder 30% and 70% coriander, 3- basal diet + 20 g of plant powder 70% black seeds, and 30% coriander. Lambs were weighed every 10 days. At the end of the experiment, before morning feeding, blood was taken from the jugular vein of the lambs in order to determine the parameters of haematology, biochemical and liver enzyme properties.

Result: Results of the research showed that consumption of dry matter was higher (5.68 percent) in 2 treatment than in the control group ($P < 0.05$). Daily weight gain and final weight also increased in the 2 and 3 treatments (17.82, 18.14 and 5.99, 6.78 percent) compared to the control group ($P < 0.05$). No significant difference was observed between the control group and treatments in terms of the feed-to-product conversion factor. The number of red blood cells in treatment 3 was higher than in the control group ($P < 0.05$), but medicinal plants did not affect the rest of the parameters related to red blood cells. Also, the concentration of platelets in treatment 2 was reported to be lower than in the control group ($P < 0.05$), but related parameters of haemoglobin and white blood cells were not

affected by medicinal plants. The blood glucose concentration of lambs was higher in experimental treatments ($P<0.05$). However, the mixture of medicinal plants did not affect triglyceride concentration, but the concentration of urea in the third treatment and the concentration of cholesterol and creatinine in the 2 treatment were lower than the control group ($P<0.05$). The concentration of protein and globulin in experimental treatments did not differ from the control group; on the contrary, albumin concentration in treatment 2 was higher than the control group ($P<0.01$). Unlike Alanine aminotransferase, the activity of aspartate aminotransferase enzyme was higher in the 2 treatments and lower in the third treatment than the control group ($P<0.01$).

Conclusion: Results of the experiment showed that the use the mixture of nigella and coriander plants with proportions of 30% nigella sativa and 70% coriander, and on the contrary, mixture of 30% nigella sativa and 70% coriander improved the performance of Ghiljai lambs and increased the concentration of serum glucose in these lambs. It reduced urea and cholesterol and had no adverse effects on other blood parameters.

Cite this article: Charkhi, W., Hozhabri, F., hamidi, Sh.A., Beheshtizadeh, H. (2025). The effect of adding of *Nigella sativa* and coriander seeds to the diet of Ghiljai lambs on performance and blood metabolites. *Journal of Ruminant Research*, 13(1), 1-18.



© The Author(s).

DOI:

Publisher: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

تأثیر افزودن بذر سیاه‌دانه و گشنیز به جیره‌بره‌های نژاد گلجائی بر عملکرد رشد و فراسنجه‌های خونی

وحیداله چرخ‌چی^{۱*}، فردین هژبری^۲، شیرآغا حمیدی^۳، هژیر بهشتی‌زاده^۴

^۱ استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بغلان، افغانستان

^۲ دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

^۳ استاد یار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بغلان، افغانستان

^۴ محقق پسا دکتری گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

اطلاعات مقاله	چکیده
نوع مقاله: مقاله کامل علمی - پژوهشی	سابقه و هدف: گیاهان دارویی از مهم‌ترین افزودنی‌های گیاهی شناخته شده در تغذیه دام‌های نشخوارکننده هستند. فواید استفاده از گیاهان دارویی در تغذیه دام از طریق بهبود مصرف خوراک، گوارش‌پذیری و متابولیسم مواد مغذی مشاهده شده است و استفاده از گیاهان دارویی در تغذیه دام جایگزین آسان‌تر و پایدارتر نسبت به منابع مصنوعی است. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی اثر افزودن مخلوط گیاهان دارویی سیاه‌دانه و گشنیز با نسبت‌های مختلف به جیره‌بره‌های نژاد گلجائی بر عملکرد، هماتولوژی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و آنزیم‌های کبدی می‌باشد.
تاریخ دریافت: تاریخ ویرایش: تاریخ پذیرش:	مواد و روش‌ها: تعداد ۲۱ رأس بره نر نژاد گلجائی با میانگین وزن $15/55 \pm 0/89$ کیلوگرم (90 ± 8 روز) در قالب طرح کاملاً تصادفی به ۳ گروه ۷ رأسی تقسیم و به مدت ۴۰ روز در جایگاه‌های انفرادی نگهداری شدند. گروه‌های آزمایشی شامل: ۱- شاهد (جیره پایه)، ۲- جیره پایه + ۲۰ گرم پودر ۲۰ درصد سیاه‌دانه و ۷۰ درصد گشنیز، ۳- جیره پایه + ۲۰ گرم پودر ۷۰ درصد سیاه‌دانه، ۳۰ درصد گشنیز بودند. بره‌ها هر ۱۰ روز یکبار، توزین شدند. در انتهای دوره قبل از خوراک‌دهی صبح، به‌منظور تعیین فراسنجه‌های هماتولوژی، بیوشیمیایی، و آنزیم‌های کبدی از سیاهرگ و داج خون گرفته شد.
واژه‌های کلیدی: آنزیم اسپاراتات آمینوترانسفراز افزایش وزن روزانه گلوکز مصرف ماده خشک	یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد، مصرف ماده خشک در تیماردوم آزمایشی نسبت به گروه شاهد $5/68$ درصد بیشتر بود ($P < 0/05$). افزایش وزن روزانه $17/82$ و $18/14$ درصد و وزن نهایی $5/99$ و $6/78$ درصد نیز در تیمارهای دوم و سوم مقایسه با گروه شاهد $17/82$ و $18/14$ درصد و افزایش داشت ($P < 0/05$). تفاوت معنی‌داری بین گروه شاهد و تیمارها از لحاظ ضریب تبدیل خوراک مشاهده نشد. شمار گلبول‌های قرمز در تیمار ۳ بیشتر از گروه شاهد بود ($P < 0/05$). اما فراسنجه‌های دیگر مربوط به گلبول‌های قرمز (میانگین حجم گلبول‌های قرمز، پراکندگی گلبول‌های قرمز و هماتوکریت) تحت تأثیر گیاهان دارویی قرار نگرفت. غلظت پلاکت‌ها در تیمار سوم کمتر از گروه شاهد گزارش شد ($P < 0/05$), همچنین

غلظت هموگلوبین و شمار گلبول‌های سفید تحت تأثیر گیاهان دارویی قرار نگرفتند. علاوه بر این غلظت گلوکز خون بره‌ها در تیمارهای دریافت‌کننده گیاهان دارویی بیشتر بود ($P < 0/05$). هرچند مخلوط گیاهان دارویی بر غلظت تری‌گلیسیرید اثری نداشت؛ ولی غلظت اوره در تیمار سوم و غلظت کلسترول و کراتینین در تیمار دوم کمتر از گروه شاهد بود ($P < 0/05$). غلظت پروتئین کل و گلبولین در تیمارهای آزمایشی با گروه شاهد تفاوت نداشت برعکس غلظت آلبومین در تیمار دوم بیشتر از گروه شاهد بود ($P < 0/01$). بر خلاف آنزیم آلانین آمینوترانسفراز فعالیت آنزیم آسپاراتات آمینوترانسفراز در تیمار دوم بیشتر و در تیمار سوم کمتر از گروه شاهد بود ($P < 0/01$).

نتیجه‌گیری: نتایج آزمایش نشان داد استفاده از مخلوط گیاهان سیاه‌دانه و گشنیز با نسبت‌های ۷۰ درصد سیاه‌دانه و ۳۰ درصد گشنیز و برعکس مخلوط ۳۰ درصد سیاه‌دانه و ۷۰ درصد گشنیز باعث بهبود عملکرد بره‌های نژاد گلجائی شد، استفاده از این تیمارها، غلظت گلوکز سرم خون را افزایش و غلظت اوره و کلسترول را کاهش داد. اما بر بقیه فراسنجه‌های خونی اثری نداشت.

استناد: چرخ‌چی، وحیداله؛ هژبری، فردین؛ حمیدی، شیرآغا؛ بهشتی‌زاده، هژیر. (۱۴۰۴). تأثیر افزودن بذر سیاه‌دانه و گشنیز به جیره‌های نژاد گلجائی بر عملکرد رشد و فراسنجه‌های خونی. پژوهش در نشخوارکنندگان، ۱۳(۱)، ۱-۱۸

DOI:



© نویسندگان.

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مقدمه

جایگزینی گیاهان دارویی به‌عنوان مواد افزودنی به‌جای آنتی‌بیوتیک‌ها در خوراک دام یک برنامه مؤثر جهت اصلاح ترکیب محصولات (اسیدهای چرب شیر و گوشت) و ماندگاری بیشتر آن از طریق متابولیت‌های ثانویه مانند تانن‌ها، ساپونین‌ها، لینا لول، پاراسیمین و غیره هستند (Shaaban, 2020). متابولیت‌های ثانویه موجود در گیاهان دارویی تخمیر شکمبه را جهت استفاده بهتر از مواد مغذی تعدیل می‌نماید (Kuralker و Kuralkar, 2021)، یعنی متابولیت‌های ثانویه موجود در گیاهان دارویی فلور میکروبی شکمبه را در نشخوارکنندگان از طریق محدود کردن متانوژن تغییر می‌دهند (Saeed و همکاران, 2021).

همچنین برخی محققین بیان کردند که افزودن گیاهان دارویی به جیره نشخوارکنندگان سبب افزایش فعالیت آنزیم‌های خارج سلولی میکروارگانیسم‌های شکمبه شده و به دنبال آن هضم خوراک تحریک شده و باعث بهبود هضم غذا، بهبود کارایی خوراک و تولید بیشتر شیر در غده پستانی می‌شود (Patil و همکاران, 2017). بنابر گزارش محققین افزودن گشنیز و یا اسانس روغنی آن نیز سبب تغییر در مصرف خوراک دام شده است؛ چنانچه افزودن ۱۴ میلی‌لیتر روغن گشنیز به جیره غذایی گاوهای شیری مصرف خوراک را ۱/۳ کیلوگرم بر اساس ماده خشک افزایش داد (Matloup و همکاران, 2017). همچنین مصرف ۱۸ درصد کنجاله سیاه‌دانه در جیره‌بره‌ها مصرف ماده خشک را افزایش داد (Karimi و همکاران, 2021). افزودن ۲۰ گرم سیاه‌دانه در روز در جیره‌های مصرف ماده خشک را افزایش داد (Mirzaei Cheshmehgachi و همکاران, 2021). متابولت‌های ثانویه (ساپونین و تانن‌ها) موجود در گیاهان دارویی تخمیر شکمبه را بهبود داده و بدین ترتیب مصرف ماده خشک بیشتر شده و افزایش وزن

روزانه نیز بیشتر می‌شود (Modi و همکاران, 2022). از طرفی نتایج مطالعات نشان داد، مصرف روزانه ۱۰ گرم مخلوط گیاهی (۳۰ درصد گشنیز، ۶۰ درصد زیره سبز و ۱۰ درصد نعناع فلفلی) (Charkhi و همکاران, 2023)، شش گرم گشنیز (Mohammed و همکاران, 2018) به ازای هر بره و ۲۰ درصد کنجاله سیاه‌دانه در جیره‌بره‌ها (Retnani و همکاران, 2019) وزن روزانه و وزن نهایی را افزایش داد.

علاوه بر این پاسخ فراسنجه‌های مختلف خون نیز با افزودن گیاهان دارویی به‌عنوان مواد افزودنی در جیره دام‌های نشخوارکننده متفاوت گزارش شده است. به‌عنوان مثال مصرف روزانه ۱۴ میلی‌لیتر روغن گشنیز اثری بر غلظت پروتئین کل، آلبومین، گلوبولین، نسبت آلبومین به گلوبولین، اوره و کلسترول خون گاوهای شیری نداشته، اما غلظت گلوکز سرم خون را افزایش داد (Gassmann و همکاران, 2019). افزودن ۲۰ گرم سیاه‌دانه در روز در جیره‌های تأثیری بر غلظت گلوکز و پروتئین، کلسترول و تری‌گلیسرید خون نداشته، ولی غلظت آلبومین را کاهش و غلظت اوره را افزایش داد (Mirzaei Cheshmehgachi و همکاران, 2021). همچنین مصرف شش درصد سیاه‌دانه در جیره بزها غلظت هموگلوبین، پروتئین و گلوبولین خون را افزایش و غلظت کلسترول، تری‌گلیسرید و آسپاراتات آمینو ترانسفراز را کاهش داد. اما بر شمار گلیول‌های قرمز، درصد هماتوکریت، غلظت گلوکز، آلبومین و کراتینین تأثیری نداشت (Elfaki و همکاران, 2023). دانه گشنیز حاوی ۲۸/۴۰ درصد روغن است و ترکیبات روغن گشنیز شامل الیفاتیکی آلدئید (۰/۳ - ۱۱/۲ درصد)، لینا لول (۵۸/۰۰ - ۸۰/۳۰ درصد)، کیمفور (۳/۰۰ - ۵/۱۰ درصد)، آلفا - پنین (۰/۲ - ۱۰/۹ درصد) می‌باشد. گشنیز به دلیل دارابودن ریوفلاوین (۰/۰۴۶ درصد)، توکوفرول (۰/۱۸۱ درصد)، پلی‌وینیل (۱۸/۷ درصد) گالیک اسید

بذر گشنیز) بودند. مقادیر استفاده شده بر اساس مطالعات قبلی انتخاب شد (Mirzaei Cheshmehgachi و همکاران، ۲۰۲۱ و همکاران، ۲۰۱۸). بره‌ها در حد اشتها تغذیه شدند؛ سنگ نمک و آب آزادانه در دسترس بره‌ها بود. دوره اصلی آزمایش به مدت ۴۰ روز به طول انجامید. جیره پایه با استفاده از جداول انجمن ملی تحقیقات^۱ (۲۰۰۷) با در نظر گرفتن احتیاجات دام‌ها تهیه شد (جدول ۱).

قبل از گروه‌بندی بره‌ها، مبارزه علیه انگل‌های داخلی با استفاده از مخلوط سوسپانسیون خوراکی ۲/۵ درصد آلبندازول (در سه مرحله و بافاصله هفت روز، به ازای هر بره به میزان ۱۰ میلی‌لیتر) انجام شد. خوراک‌دهی روزانه در سه وعده (۸ ساعت یکبار) ساعات شش صبح، دو بعد از ظهر و ۱۰ شب انجام شد و مقدار خوراک باقی مانده روز قبل، به منظور محاسبه خوراک مصرفی روزانه توزین شد. بره‌ها در طول دوره و هر ۱۰ روز یکبار برای دو روز متوالی قبل از خوراک‌دهی صبح توزین شدند و میانگین وزن دو روز به عنوان وزن مورد نظر ثبت شد (Charkhi و همکاران، ۲۰۲۳). جهت تعیین ترکیب شیمیایی جیره‌ها، در زمان‌های مختلف (روز اول و هر پنج روز یکبار) دوره آزمایش، از خوراک‌ها نمونه‌برداری شد (Yavari و همکاران، ۲۰۲۲) و پس از آسیاب نمودن ترکیب شیمیایی آنها بر اساس روش پیشنهادی انجمن رسمی شیمی دانان کشاورزی (۱۹۹۰) و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی طبق روش (Van Soest و همکاران، ۱۹۹۱) تعیین شد.

(۰/۱۷۳ درصد) کافیک اسید (۰/۰۸ درصد) ایلاجیک اسید (۰/۱۶۲ درصد) کوارسیتین (۰/۶۰۸ درصد) و کیمفیروول (۰/۲۳۳ درصد) بهترین خواص آنتیاکسیدانی را دارد (Mohammed و همکاران، ۲۰۱۸). همچنین سیاه‌دانه دارای ۸۵ - ۸۷ درصد اسانس است و بیشترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس بذر این گیاه پاراسیمین (۴۰/۱۰ درصد)، آلفا توجین (۱۹/۷۰ درصد)، تیموکینن (۱۳/۸۰ درصد)، بیتاپنین (۶/۰۰ درصد)، گاماترپنین (۴/۷۰ درصد) و آلفاپنین (۴/۵۰ درصد) می‌باشند (Farhoudi و Modhej، ۲۰۱۸). هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات استفاده از مخلوط گیاهان دارویی (سیاه‌دانه و گشنیز) با نسبت‌های مختلف در جیره بره‌های نژاد غلجائی بر عملکرد دام و فراسنجه‌های خون و آنزیم‌های کبدی می‌باشد.

مواد و روش‌ها

محل انجام آزمایش و حیوانات آزمایشی: این پژوهش در یک گوسفندداری خصوصی در شهرستان چرخ استان لوگر افغانستان، در تیرماه سال ۱۴۰۲ اجرا شد. ۲۱ رأس بره نر نژاد غلجایی (8 ± 90 روزه) با میانگین وزن $15/55 \pm 0/89$ کیلوگرم از گله ۳۰۰ رأسی انتخاب و در قالب طرح کاملاً تصادفی به ۳ تیمار ۷ رأسی تقسیم و هر یک از بره‌ها داخل جایگاهی انفرادی (۱/۵۰ × ۱/۵۰ متر) قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل: ۱- شاهد (جیره پایه)، ۲- جیره پایه به‌علاوه ۲۰ گرم پودر مخلوط گیاهان دارویی (۳۰ درصد بذر سیاه‌دانه و ۷۰ درصد بذر گشنیز)، ۳- جیره پایه به‌علاوه ۲۰ گرم مخلوط پودر گیاهان دارویی (۷۰ درصد بذر سیاه‌دانه و ۳۰ درصد

¹ National Research Council(NRC)

تأثیر افزودن بذر سیاه‌دانه و گشنیز به جیره‌بره‌های... / وحیداله چرخ‌چی و همکاران

جدول ۱- اقلام خوراکی جیره پایه (درصد ماده خشک)

Table 1- Components of the basic diet (% DM)

درصد (%)	اجزای جیره (Ration components)
26.00	علوفه یونجه (Alfalfa hay, chopped)
14.00	کاه گندم (Wheat straw, chopped)
20.50	دانه جو (Barley ground)
16.00	دانه ذرت آسیاب شده (Corn grain, ground)
9.90	سیوس گندم (Wheat barn)
12.00	کنجاله سویا (Soybean meal)
1.45	مکمل معدنی و ویتامینی (Minerals and vitamins supplement) ^۱
0.15	سنگ‌آهک ^۱ (Limestone)

^۱ مشمول: ویتامین دی ۳۰۰۰۰ واحد در کیلوگرم، ویتامین آ (۲۵۰۰۰ واحد در کیلوگرم) و ویتامین ای (۱۵۰۰ واحد در کیلوگرم)، کلسیم (۱۲۰ گرم در کیلوگرم)، منیزیم (۲/۲۵ گرم در کیلوگرم)، مگنیشم (۲۰/۵۰ گرم در کیلوگرم)، ید (۵۶ گرم در کیلوگرم) سدیم (۱۸۶ گرم در کیلوگرم)، فاسفور (۲۰ گرم در کیلوگرم)، آهن (۱/۲۵ گرم در کیلوگرم)، مس (۱/۲۵ گرم در کیلوگرم)، گوگرد (۳ گرم در کیلوگرم)، کبالت (۱۴ میلی گرم در کیلوگرم) و سلنیم (۱۰ میلی گرم در کیلوگرم).

vitamin D (50,000 IU/kg), vitamin A (250,000 IU/kg) and vitamin E (1,500 IU/kg), calcium (120g/kg), manganese (2.25 g/kg), zinc (7.7 g/kg), magnesium (20.5 g/kg), iodine (56 mg/kg), sodium (186 g/kg), phosphorus (20 g/kg), iron (1.25 g/kg), copper (1.25 g/kg), sulfur (3 g/kg), cobalt (14 mg/kg) and selenium (10mg/kg).

جدول ۲- ترکیب شیمیایی جیره پایه و مخلوط گیاهان دارویی (درصد ماده خشک)

Table 2- Chemical composition of the basic diet and mixture of medicinal plants (%DM)

مخلوط گیاهی ۲ (Herbal mixture)	مخلوط گیاهی ۱ (Herbal mixture)	جیره پایه (Basal diet)	ترکیب شیمیایی (درصد ماده خشک) [Chemical composition (% dry matter)]
95.00	94.60	89.00	ماده خشک [Dry matter (DM)]
19.00	17.20	16.50	پروتئین خالص (Crud protein)
9.30	9.00	6.00	خاکستر (Ash)
6.20	5.70	3.90	چربی خام (Ether Extract)
33.60	35.60	35.00	الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF)
21.90	23.40	20.00	الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF)
2.30	2.00	1.80	انرژی قابل سوخت‌وساز ^۳ (مگا کالری در کیلوگرم)

^۱ Contains 30% of nigella sativa and 70% of coriander

^۱ شامل ۳۰ درصد سیاه دانه و ۷۰ درصد گشنیز

^۲ Contains 70% of nigella sativa and 30% of coriander

^۲ شامل ۷۰ درصد سیاه دانه و ۳۰ درصد گشنیز

زمان آنالیز نگهداری شدند. ارزیابی سلول‌های خون با استفاده از دستگاه شمارشگر خودکار سلول‌های خونی Automatic blood cell Counter; Exigo Vet.,) (Boule Medicinal AB Inc., Stochholm, Swedish انجام شد. اندازه‌گیری متابولیت‌های بیوشیمیایی خون مانند گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید، پروتئین کل و آنزیم‌های کبدی با استفاده از کیت‌های آزمایشی تجاری بر اساس توصیه شرکت سازنده کیت انجام شد.

خون‌گیری و تعیین فراسنجه‌های خون: در انتهای دوره، قبل از خوراک‌دهی صبح، از سیاهرگ وداج خون‌گیری به عمل آمد. از دو نوع سرنگ‌های حاوی ماده ضدانعقاد هپارین و بدون هپارین استفاده شد. نمونه‌های خون بدون هپارین به مدت ۱۵ دقیقه در ۲۵۰۰ دور در دقیقه و دمای ۴ درجه سانتی‌گراد سانتریفیوژ شدند و مقادیر مشخص از مایع شفاف بالایی توسط سمپلر به داخل میکروتیوب‌های دو میلی‌لیتری منتقل و در دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد تا

روش آنالیز آماری

تجزیه و تحلیل داده‌ها در قالب طرح کاملاً تصادفی، با نرم‌افزار SAS (2003) ویرایش ۹/۱ انجام شد. مقایسه میانگین‌ها با آزمون توکی، در سطح $\alpha = 0/05$ انجام شد. مدل آماری در رابطه (بیان شده است).

$$Y_{ij} = \mu + T_i + \varepsilon_{ij} \quad (\text{رابطه ۱})$$

Y_{ij} = متغیر وابسته، μ : میانگین کل، T_i : اثر تیمار، ε_{ij} : اثر خطای آزمایش است.

با توجه به اینکه پژوهش حاضر روی بره‌های نژاد غلجائی انجام شد بهتر است اطلاعات مختصری در مورد ویژگی‌های این نژاد ارائه کنیم: گوسفند نژاد غلجائی دومین نژاد بزرگ گوسفندان افغانی را از نظر جمعیت (شش میلیون رأس) تشکیل می‌دهد و بیشتر می‌دهد استان‌های هرات، قندهار، فراه، هلمند، غزنی، کابل، پروان، غور، ننگرهار، پکتیا و لوگر افغانستان پرورش داده می‌شوند. این نژاد بیشتر چندمنظوره‌ای هستند (تولید پشم، گوشت و شیر) و در شرایط دشوار این مناطق سازگاری نشان داده‌اند. وزن میش این نژاد ۴۰ - ۳۵ کیلوگرم و قوچ بالغ ۵۵ - ۵۰ کیلوگرم می‌باشد دوقلو زایی این نژاد ۷۵ - ۷۰ درصد است (Hashimi, ۲۰۱۶).

مصرف خوراک و تغییرات وزن: نتایج مربوط به اثر استفاده از مخلوط گیاهان دارویی بر عملکرد بره‌ها در (جدول ۳) ارائه شده است. افزودن مخلوط گیاهان دارویی سیاه‌دانه و گشنیز به جیره بره‌ها، مصرف ماده خشک را در تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد (۸/۷۲ و ۱۲/۶۹ درصد) افزایش داد ($P < 0/05$). در تطابق با نتایج پژوهش حاضر، جایگزینی پنج درصد یونجه با تخم گشنیز (Khamisabadi و Ahmadpanah, ۲۰۲۰) و ۱۸ درصد کنجاله سیاه‌دانه (Karimi و همکاران، ۲۰۲۱) در جیره بره‌ها مصرف ماده خشک را افزایش دادند. اما مصرف شش گرم تخم گشنیز در روز به ازای هر رأس گوسفند (Mohammed و همکاران، ۲۰۱۸) و افزودن ۱۰ و ۲۰

درصد کنجاله سیاه‌دانه در جیره بره‌ها تأثیری بر مصرف ماده خشک نداشت (Retnani و همکاران، ۲۰۱۹). ترکیبات موجود در گیاهان دارویی عملکرد سیستم گوارشی را بهبود داده و مصرف ماده خشک را افزایش می‌دهند (Mohammed و همکاران، ۲۰۱۸).

علاوه بر این نتایج نشان داد (جدول ۳)، افزایش وزن روزانه و وزن نهایی در بره‌های تیمارهای دوم و سوم (به ترتیب ۱۷/۸۲، ۱۸/۲۰ و ۵/۹۹، ۶/۷۸ درصد) نسبت به گروه شاهد بیشتر و این تفاوت‌ها با گروه شاهد از لحاظ آماری نیز در سطح ($P < 0/01$) و ($P < 0/05$) معنی دار شدند. در تطابق با نتایج حاضر، استفاده از کنجاله سیاه‌دانه به میزان ۱۵۰ گرم در کیلوگرم ماده خشک (Obeidat, ۲۰۲۰) و افزودن شش گرم در روز گشنیز به جیره بره‌ها وزن روزانه و وزن نهایی را افزایش داد (Mohammad و همکاران، ۲۰۱۸). برخلاف این گزارش‌ها، مصرف ۰/۳۰ گرم سیاه‌دانه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تأثیری بر وزن نهایی و وزن روزانه بره‌های پرواری نداشت (Yavari و همکاران، ۲۰۲۲). محققین معتقدند مصرف گیاهان دارویی درجیره نشخوارکنندگان با تأثیر بر میکروارگانیسم‌های شکمبه سبب آزادسازی بیشتر آنزیم‌های گوارشی شده و از این طریق باعث بهبود هضم خوراک می‌شوند (Patil و همکاران، ۲۰۱۷). بهبود در هضم و مصرف بیشتر خوراک، افزایش وزن را به دنبال دارد (Yaghubi و همکاران، ۲۰۱۹). با توجه به نتایج پژوهش حاضر، مخلوط گیاهان دارویی سیاه‌دانه و گشنیز بانسبتهای مختلف تأثیر معنی داری بر ضریب تبدیل خوراک در هیچ کدام از تیمارهای آزمایشی نداشت. بر خلاف این گزارش‌ها، گیاهان دارویی و اسانس‌های روغنی موجود در آنها ممکن است از طریق تحریک فعالیت آنزیم‌های ترشحی و تعادل فلور میکروبی دستگاه گوارش، ضریب تبدیل خوراک را بهبود دهند (Yaghubi و همکاران، ۲۰۱۹).

تأثیر افزودن بذر سیاه‌دانه و گشنیز به جیره‌بره‌های... / وحیداله چرخ‌چی و همکاران

جدول ۳- اثر استفاده گیاهان دارویی در جیره بر عملکرد بره‌های نژاد غلجایی
Table 3- The effect of medicinal herbs in the diet on performance of Ghaljai lambs

P value	SEM	تیمارهای آزمایشی ^۱			فراسنجه (Parameter)
		3	2	1	
0.05	38.672	1155.71 ^a	1105.43 ^{ab}	1090.14 ^b	مصرف ماده خشک (گرم روز) [Dry matter intake]
0.05	5.064	198.15 ^a	191.53 ^{ab}	178.90 ^b	ماده خشک مصرفی روزانه گرم در کیلوگرم وزن متابولیکی [Daily intake of dry matter (g/kg of metabolic weight)]
0.56	0.348	15.55	15.38	15.73	وزن اولیه (کیلوگرم) (Initial weight)
0.01	6.669	271.79 ^a	270.72 ^a	222.50 ^b	افزایش وزن روزانه (گرم) (Daily weight gain)
0.01	0.267	10.88 ^a	10.83 ^a	8.90 ^b	کل وزن اضافی دوره (کیلوگرم) (Total weight gain)
0.05	0.402	26.42 ^a	26.20 ^a	24.63 ^b	وزن نهایی (کیلوگرم) (Final weight)
0.29	0.207	4.29	4.09	4.75	ضریب تبدیل غذایی (Feed conversion ratio)

^{a,b} تفاوت میانگین‌ها با حروف نا مشابه در هر ردیف معنی‌دار است ($P < 0.05$).

^۱ گروه شاهد: جیره پایه (بدون مکمل گیاهی); ^۲ = جیره پایه + ۲۰ گرم مخلوط سیاه‌دانه، (۳۰ درصد) و گشنیز (۷۰ درصد); ^۳ = جیره پایه + ۲۰ گرم مخلوط سیاه‌دانه (۷۰ درصد) و گشنیز (۳۰ درصد)

SEM = خطای معیار میانگین

the difference between means with different letters in each row is significant ($P > 0.05$).

^۱ Control treatment: basic diet (without herbal supplement); ^۲ = first treatment: basal diet + 20 g of mixture of nigella sativa and coriander seeds of 30 and 70 percent; ^۳ = second treatment: basal diet + 20 g of nigella sativa and coriander seeds mixture, 70% and 30%, respectively.

SEM = Standard Error of the Mean

تیمار سوم کمتر بود ($P < 0.05$)، ولی با گروه شاهد معنی‌دار نشد. بالابودن درصد پراکندگی گلبول‌های قرمز از حد طبیعی نشان می‌دهد که اندازه گلبول‌های قرمز باهم خیلی متفاوت‌اند و علت آن می‌تواند کمبود آهن در خون (از طریق مشکلات کبدی به ویژه جذب کمتر آهن) باشد (Yamada و همکاران، ۲۰۲۰). علاوه بر این میانگین حجم گلبول‌های قرمز و درصد هماتوکریت در تیمارهای آزمایشی تحت‌تأثیر مخلوط گیاهان دارویی (سیاه‌دانه و گشنیز) قرار نگرفت. در مطابقت با نتایج پژوهش حاضر، مصرف شش گرم گشنیز در روز در جیره میش‌های شیرده (Mohammed و همکاران، ۲۰۱۸) و شش درصد سیاه‌دانه در جیره بزهای درحال‌رشد (Elfaki و همکاران، ۲۰۲۳). فراسنجه‌های به‌دست‌آمده مربوط به گلبول‌های قرمز به ویژه شمار گلبول‌های قرمز در محدوده طبیعی گزارش شده برای بره‌ها بود (۱۱/۷۶ – ۱۳/۳۸ و ۷/۶۳ و ۱۰۶۸/۹۴ در میلی‌لیتر بود)

هماتولوژی بره‌ها: تأثیر افزودن بذر سیاه‌دانه و گشنیز در رژیم غذایی بره‌ها در (جدول ۴) نشان‌داده شده است. شمار گلبول‌های قرمز در تیمار دوم (۷۰ درصد سیاه‌دانه و ۳۰ درصد گشنیز) نسبت به گروه شاهد بیشتر بود ($P < 0.05$). بر خلاف نتایج پژوهش حاضر، شش گرم گشنیز در روز (Mohammed و همکاران، ۲۰۱۸) و ۲۰ درصد کنجاله سیاه‌دانه (Retnani و همکاران، ۲۰۱۹) در جیره بره‌ها تأثیری بر غلظت گلبول‌های قرمز خون دام‌های تحت آزمایش نداشت. هرچند مصرف ۴۷ گرم روغن سیاه‌دانه در کیلوگرم کنسانتره بره‌ها (Abd ElHalim و همکاران، ۲۰۱۴). غلظت گلبول‌های قرمز خون را کاهش داد. کمبود تعداد سلول‌های قرمز خون باعث کم‌خونی شده و افزایش گلبول‌های قرمز در خون در اثر اختلال در کلیه و مغز استخوان بروز می‌کند، مسئولیت گلبول‌های قرمز خون انتقال اکسیژن به تمام بدن است (Alfaro و همکاران، ۲۰۲۱). همچنین درصد پراکندگی گلبول‌های قرمز در تیمار دوم بیشتر و در

Charkhi و همکاران، ۲۰۲۴؛ Shams Al-dain و Jarjeis، ۲۰۱۵).

نتایج نشان داد (جدول ۴)، بره‌های که روزانه ۲۰ گرم مخلوط سیاه‌دانه و گشنیز دریافت کردند غلظت پلاکت‌های خون در آنها کمتر از گروه شاهد بود ($P < 0/05$)، هرچند؛ میانگین حجم پلاکت‌ها تحت تأثیر گیاهان داوریی قرار نگرفت ($P > 0/05$). در تطابق با نتایج پژوهش حاضر، مصرف ۱۰ گرم مکمل مخلوط گیاهی (۶۰ درصد گشنیز) در جیره بره‌ها غلظت پلاکت‌های خون را افزایش داد و بر میانگین حجم پلاکت‌ها اثری نداشت (Charkhi و همکاران، ۲۰۲۳). اما افزودن ۶۰۰ ملی گرم بذر سیاه‌دانه (Shams Al-dain و Jarjeis، ۲۰۱۵) و شش گرم گشنیز در روز (Mohammed و همکاران، ۲۰۱۸) به جیره بره‌ها تأثیری بر غلظت پلاکت‌ها نداشت. همچنین نتایج نشان داد، غلظت هموگلوبین در تیمار آزمایشی (۳۰ درصد سیاه‌دانه و ۷۰ درصد گشنیز) بیشتر و در تیمار آزمایشی (۷۰ درصد سیاه‌دانه و ۳۰ درصد گشنیز) کمتر بود ($P < 0/05$) ولی هیچ کدام از تیمارها با گروه شاهد تفاوت معنی داری نداشت. از طرفی مخلوط سیاه‌دانه و گشنیز در جیره بره‌ها تأثیری بر میانگین غلظت هموگلوبین نداشت ($P > 0/05$). در تطابق با نتایج پژوهش حاضر افزودن ۶۰۰ میلی‌گرم بذر سیاه‌دانه در کیلوگرم جیره بره‌ها غلظت هموگلوبین و میانگین غلظت هموگلوبین را افزایش داد (Shams Al-dain و Jarjeis، ۲۰۱۵). غلظت هموگلوبین در تحقیق حاضر در محدوده طبیعی گزارش شده برای بره‌ها (۱۰/۲۲ - ۱۰/۸۰) بود (Charkhi و همکاران، ۲۰۲۳).

افزودن مخلوط گیاهان سیاه‌دانه و گشنیز به جیره بره‌ها تأثیر معنی‌داری بر فراسنجه‌های مربوط به گلبول‌های سفید (شمار گلبول‌های سفید، درصد مونوسیت‌ها، لنفوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها) نداشت. در

تطابق با نتایج حاضر، افزودن پنج درصد گشنیز به جیره غذایی بره‌های پرواری (Khamiabadi و Ahmadpanah، ۲۰۲۰) و شش گرم گشنیز در روز در جیره‌میش‌ها (Mohammed و همکاران، ۲۰۱۸) تأثیری بر فراسنجه‌های مربوط گلبول‌های سفید خون نداشت. برخلاف این گزارشات، مصرف شش درصد سیاه‌دانه در جیره بزها تعداد گلبول‌های سفید خون را کاهش داد (Elfaki و همکاران، ۲۰۲۳). گزارش شده است که تأثیر مثبت گیاهان داوریی بر برخی فراسنجه‌های خونی دام ممکن است مرتبط با اسیدفولیک، آهن و ویتامین C موجود در این گیاهان باشد؛ به‌نحوی که این ترکیبات، فاکتورهای خون‌ساز هستند و تولید خون در مغز استخوان را تحریک می‌کنند (Khattab و همکاران، ۲۰۱۱). همچنین افزایش در تعداد گلبول‌های قرمز ممکن است به این دلیل باشد که سیاه‌دانه دارای ترکیب فعالی مانند تیموکینین و مشتقات آن است که ممکن است مکانیسم دفاعی بدن در برابر عفونت را افزایش داده باشد (Shams Al-dain و Jarjeis، ۲۰۱۵).

بیوشیمی خون بره‌ها: نتایج نشان داد (جدول ۵) افزودن مخلوط ۲۰ گرم سیاه‌دانه و گشنیز در روز به جیره غلظت گلوکز سرم را در بره‌های که در تیمارهای آزمایشی بودند در مقایسه با گروه شاهد ۷/۸۶ و ۷/۲۳ درصد افزایش داد و این تفاوت بین تیمارهای آزمایشی با گروه شاهد معنی دار شد ($P < 0/05$). در تطابق با نتایج پژوهش حاضر، جایگزینی نه درصد کنجاله سیاه‌دانه با کنجاله کلزا در جیره بره‌ها غلظت گلوکز سرم را افزایش دادند (Roshani و همکاران، ۲۰۲۱). هرچند؛ مصرف ۰/۳۰ گرم سیاه‌دانه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بره‌ها تأثیر بر غلظت گلوکز سرم خون نداشت (Yavari و همکاران، ۲۰۲۲). برخی از محققین گزارش دادند، گیاهان داوریی در جیره با افزایش غلظت پروپونوات

تأثیر افزودن بذر سیاه‌دانه و گشنیز به جیره‌بره‌های... / وحیداله چرخ‌چی و همکاران

نسبت به استات افزایش می‌دهند (Farghaly و Abdulla، ۲۰۲۱). غلظت‌های بدست آمده برای گلوکز در گزارش حاضر، در محدوده طبیعی گزارش شده برای بره‌ها (۶۵/۶۰ - ۷۵ و ۶۸/۵۵ - ۷۸/۹۴ میلی گرم در دسی لیتر) بود (Charkhi و همکاران، ۲۰۲۳؛ Retnani و همکاران، ۲۰۱۹).

در شکمبه از طریق بهبود گوارش پذیری خوراک سبب افزایش غلظت گلوکز خون می‌شوند (Morsy و همکاران، ۲۰۱۸)، این محققین دلیل عمده تغییر در سطح گلوکز خون را افزایش تولید پروپینونات نسبت به استات در شکمبه بیان کردند، یعنی متابولیت‌های ثانویه موجود در گیاهان دارویی از طریق کاهش متانوژن‌ها و تولیدمتان غلظت پروپینونات را در شکمبه

جدول ۴- اثر گیاهان دارویی سیاه‌دانه و گشنیز در جیره بر فراسنجه‌های هماتولوژی بره‌ها

Table 4. The effect of nigella sativa and coriander medicinal plants in the diet of lambs on hematological parameters

P value	SEM	گروه‌های آزمایشی (Experimental treatments)			فراسنجه (Parameter)
		3	2	1	
0.05	0.435	11.96 ^a	10.28 ^b	10.28 ^b	تعداد سلول‌های قرمز (۱۰ ^۶ در میلی لیتر) (RBC)
0.75	1.47	40.49	41.50	42.07	میانگین حجم گلبول‌های قرمز (فمتولیتتر) (MCV)
0.05	0.818	23.23 ^b	26.66 ^a	24.40 ^{ab}	پراکندگی گلبول‌های قرمز (درصد) (RDW)
0.15	1.455	28.89	29.93	23.06	هماتوکریت (درصد) (HCT)
0.05	9.437	394.90 ^{ab}	367.17 ^b	407.06 ^a	پلاکت‌های خون (۱۰ ^۹ در لیتر) (PLT)
0.47	0.633	5.55	6.48	5.45	میانگین حجم پلاکت‌ها (فمتولیتتر) (MPV)
0.05	0.662	10.37 ^b	12.78 ^a	10.90 ^{ab}	هموگلوبین (گرم در دسی لیتر) (HGB)
0.93	0.688	10.62	10.40	10.23	غلظت هموگلوبین (فمتولیتتر) (MCH)
0.83	0.769	12.98	12.45	13.05	تعداد گلبول‌های سفید خون (۱۰ ^۳ در میلی لیتر) (WBC)
0.34	0.599	11.32	11.69	10.43	مونوسیت‌ها (درصد) (MON)
0.14	2.029	46.79	49.66	52.68	لنفوسیت‌ها (درصد) (LYM)
0.85	1/149	39.13	39.83	40.03	نوتروفیل‌ها (درصد) (SEG)

^{a,b} تفاوت میانگین‌ها با حروف نا مشابه در هر ردیف معنی‌دار است ($P < 0.05$).

^۱ گروه شاهد: جیره پایه (بدون مکمل گیاهی)؛ ۲ = جیره پایه + ۲۰ گرم مخلوط سیاه‌دانه، (۳۰ درصد) و گشنیز (۷۰ درصد)؛ ۳ = جیره پایه + ۲۰ گرم مخلوط سیاه‌دانه (۷۰ درصد) و گشنیز (۳۰ درصد)

SEM = خطای معیار میانگین

the difference between means with different letters in each row is significant ($P > 0.05$).

¹ = Control treatment: basic diet (without herbal supplement); ² = first treatment: basal diet + 20 g of mixture of nigella sativa and coriander seeds of 30 and 70 percent; ³ = second treatment: basal diet + 20 g of nigella sativa and coriander seeds mixture, 70% and 30%, respectively.

SEM = Standard Error of the Mean

همکاران، ۲۰۲۳) و ۱۴ میلی لیتر روغن گشنیز در جیره گاوهای شیری (Matloup و همکاران، ۲۰۱۷) تأثیری بر غلظت نیتروژن اوره‌ای خون نداشت. ولی مصرف ۰/۳۰ گرم سیاه‌دانه به‌ازای هر کیلوگرم وزن بدن بره‌ها نیتروژن اوره‌ای خون را کاهش داد (Yavari و همکاران، ۲۰۲۲). افزایش غلظت اوره

همچنین نتایج نشان داد، غلظت نیتروژن اوره‌ای خون در تیمار دوم آزمایشی نسبت به گروه شاهد کاهش معنی‌دار داشت ($P < 0.05$) ولی چنین اثری در تیمار دریافت‌کننده (۳۰ درصد سیاه‌دانه و ۷۰ درصد گشنیز) با گروه شاهد مشاهده نشد. هر چند؛ مصرف شش درصد سیاه‌دانه در جیره بزها (Elfaki و

۵۰/۰۰ و ۴۴/۹۵ - ۶۹/۲۸ میلی گرم در دسی لیتر) بود (Charkhi و همکاران، ۲۰۲۴؛ Kaki و همکاران، ۲۰۱۸؛ Yavari و همکاران، ۲۰۲۲).

نتایج داده‌های (جدول ۵) نشان داد که مصرف روزانه ۲۰ گرم مکمل گیاهان دارویی ۳۰ درصد سیاه‌دانه و ۷۰ درصد گشنیز غلظت کراتین خون بره‌ها را کاهش داد ($P < 0/05$) ولی مخلوط ۷۰ درصد سیاه‌دانه و ۳۰ درصد گشنیز تأثیری معنی داری بر این فراسنجه نداشت. در تطابق با نتایج پژوهش حاضر، مصرف مخلوط ۱۰ گرم مکمل گیاهی حاوی ۴۵ درصد گشنیز غلظت کراتین را کاهش داد (Charkhi و همکاران، ۲۰۲۳). از طرفی گزارش شده است که افزودن سه درصد ماده خشک تخم گشنیز در جیره بره‌ها (Khamisabadi و Ahmadpanah، ۲۰۲۰) و شش درصد سیاه‌دانه در جیره بزها (Elfaki و همکاران، ۲۰۲۳) تأثیری بر اوره و کراتین خون آنها نداشت. کراتین پسماندی شیمیایی است که توسط متابولیسم عضلانی تولید می‌شود.

افزودن مخلوط سیاه‌دانه و گشنیز به جیره بره‌ها تأثیری معنی داری بر غلظت پروتئین کل، گلوبولین و نسبت آلبومین بر گلوبولین خون نداشت؛ ولی غلظت آلبومین در تیمار دریافت‌کننده مخلوط گیاهان دارویی ۳۰ درصد سیاه‌دانه و ۷۰ درصد گشنیز نسبت به گروه شاهد بیشتر بود ($P < 0/05$). نتایج مطالعات نشان داد، مصرف ۲۰ گرم سیاه‌دانه در روز در جیره بره‌ها غلظت پروتئین و آلبومین خون را افزایش دادند (Kaki و همکاران، ۲۰۱۸). هرچند؛ مصرف ۱۴ میلی لیتر در روز روغن گشنیز اثری بر غلظت پروتئین خون گاوهای شیری نداشت (Maltoup و همکاران، ۲۰۱۷). افزایش آلبومین خون مطابق با افزودن گیاهان دارویی در جیره ممکن است به دلیل وجود ترین‌های فلاونوئیدی و ترکیبات استروئیدی در آنها باشد که ترشح طبیعی کورتیزون را تحریک می‌کنند (Allam و

خون باعث ایجاد رادیکال‌های آزاد و آسیب به سلول-ها می‌شود؛ به‌علاوه بالابودن این فراسنجه بیانگر افزایش تجزیه پروتئین‌ها است که با پایین آمدن عملکرد سیستم ایمنی بدن همراه است (McPherson و Pincus، ۲۰۲۱). غلظت‌های به‌دست‌آمده برای نیتروژن اوره‌ای در گزارش حاضر، در محدوده طبیعی گزارش شده برای بره‌ها (۳۹/۰۰ - ۳۹/۵۸ و ۲۲/۴۰ - ۳۵/۰۸ میلی گرم در دسی لیتر) بود (Kaki و همکاران، ۲۰۱۸؛ Charkhi و همکاران، ۲۰۲۳).

علاوه بر این نتایج داده‌های مرتبط به (جدول ۵) نشان داد، مصرف مخلوط گیاهان دارویی سیاه‌دانه و گشنیز تأثیر معنی داری بر غلظت تری گلیسرید خون بره‌ها نداشت ولی غلظت کلسترول در تیمارهای دریافت‌کننده مخلوط گیاهان دارویی کمتر از گروه شاهد بود ($P < 0/05$). در تطابق با نتایج پژوهش حاضر، افزودن ۲۰ گرم سیاه‌دانه در روز (Mirzaei Cheshmehgachi و همکاران، ۲۰۲۱) و شش گرم گشنیز (Mohammed و همکاران، ۲۰۱۸) در جیره می‌شود تأثیری بر غلظت تری گلیسرید خون نداشت. همچنین مصرف ۰/۳۰ گرم سیاه‌دانه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بره (Yavari و همکاران، ۲۰۲۲) و ۱/۹ گرم گشنیز در کیلوگرم خوراک بزهای شیری (Kholif و Olafadehan، ۲۰۲۱) غلظت کلسترول خون را کاهش داد. کاهش غلظت کلسترول ممکن است به علت مواد فعال موجود در سیاه‌دانه مانند تیموکینون و ترکیباتی مانند اسیدهای چرب غیراشباع باشد که باعث کاهش تولید کلسترول به وسیله سلول‌های کبدی و کاهش جذب آن از روده کوچک می‌شوند (Roshani و همکاران، ۲۰۲۱). غلظت‌های بدست‌آمده برای کلسترول و تری گلیسرید در گزارش حاضر، در محدوده طبیعی گزارش شده برای بره‌ها (تری گلیسرید ۲۳/۰۰ - ۳۱/۷۴ میلی گرم در دسی لیتر) و (کلسترول ۳۷/۰۱ -

تجزیه پروتئین توسط کبد است و آسیب‌دیدگی کبدی، معمولاً با بالارفتن میزان آن همراه است (Navaei و همکاران، ۲۰۲۰). در تطابق با نتایج پژوهش حاضر، گزارش شده است، برخی از ترکیبات فنولی مانند اتیل استات، ترانس آنتول، کو مارین و مشتقات آنها در گیاهان دارویی باعث افزایش سطح این آنزیم می‌شود (Mokhtari و همکاران، ۲۰۱۵). مقادیر به‌دست‌آمده برای این آنزیم در محدوده طبیعی گزارش شده (۶۲/۳۴ تا ۱۰۰/۴۳ واحد در لیتر) برای بره‌ها بود (Navaei و همکاران، ۲۰۲۰).

همچنین فعالیت آنزیم آلانین آمینوترانسفراز تحت تأثیر افزودن مکمل گیاهی به جیره بره‌ها قرار نگرفت. در تطابق با نتایج پژوهش حاضر، مصرف شش گرم گشنیز در روز در جیره‌میش‌ها (Abass و همکاران، ۲۰۲۰) و ۲۰ گرم سیاه‌دانه در جیره‌بره‌ها (Kaki و همکاران، ۲۰۱۸) تأثیری بر فعالیت آنزیم آلانین آمینوترانسفراز نداشت. ولی مصرف ۰/۳۰ گرم سیاه‌دانه به‌ازای هر کیلوگرم وزن بدن بره‌ها (Yavari و همکاران، ۲۰۲۲) و جایگزینی ۶۶ درصد کنجاله پنبه دانه با کنجاله زیره سیاه در جیره‌بره‌ها (Abullah و Farghaly، ۲۰۱۹). فعالیت آنزیم آلانین آمینوترانسفراز را کاهش داد. آسیب‌دیدگی کبدی، معمولاً با بالارفتن میزان این آنزیم همراه است (Navaei و همکاران، ۲۰۲۰). مقادیر به‌دست‌آمده برای این آنزیم در محدوده طبیعی گزارش شده برای بره‌ها (۸/۵۵-۱۱/۳۳ و ۱۹/۸۰-۱۱/۰۵ واحد در لیتر) بود (Charkhi و همکاران، ۲۰۲۴؛ Kaki و همکاران، ۲۰۱۸).

(Elaipe، ۲۰۲۰). همچنین آلبومین یکی از مهم‌ترین پروتئین‌های انتقال‌دهنده در پلاسما است. آلبومین ۵۰ درصد پروتئین‌های موجود در پلاسما خون را تشکیل می‌دهد، از این‌رو نوسانات آن بر غلظت پروتئین‌های خون تأثیر قابل‌توجهی دارد (Ohnson و همکاران، ۱۹۹۹). مقادیر به‌دست‌آمده برای پروتئین کل خون در محدوده طبیعی گزارش شده برای بره‌ها ۷/۷۰ - ۸/۰۰ و ۶/۴۳ - ۸/۵۸ بود (Kaki و همکاران، ۲۰۱۸؛ Shams Al-dain و Jarjeis، ۲۰۱۵). تأثیر استفاده از ۲۰ گرم در روز مخلوط گیاهان سیاه‌دانه و گشنیز بر آنزیم‌های کبدی در (جدول ۵) نشان‌دهنده شده است. فعالیت آنزیم آسپاراتات آمینوترانسفراز نسبت به گروه شاهد در تیمار که مخلوط ۳۰ درصد سیاه‌دانه و ۷۰ درصد گشنیز دریافت کرده بودند، بیشتر و لی در تیمار که نسبت سیاه‌دانه در آن ۷۰ درصد و گشنیز ۳۰ درصد بود، کمتر گزارش شده و تغییرات در هر تیمارهای آزمایشی از نظر آماری با گروه شاهد معنی‌دار شد ($P < 0/05$). گزارش شده که مصرف ۰/۳۰ گرم سیاه‌دانه به‌ازای هر کیلوگرم وزن بدن بره‌ها (Yavari و همکاران، ۲۰۲۲) و شش گرم گشنیز در روز در جیره‌میش‌ها (Mohammed و همکاران، ۲۰۱۸) فعالیت آنزیم آسپاراتات آمینوترانسفراز را کاهش داد. ولی مصرف ۱۴ میلی‌لیتر در روز روغن گشنیز در جیره گاوهای شیری اثری بر فعالیت آنزیم آسپاراتات آمینوترانسفراز نداشت (Maltoup و همکاران، ۲۰۱۷). افزایش بیش از حد آنزیم آلانین آمینوترانسفراز در خون می‌تواند نشان‌دهنده نارسایی حاد کبدی باشد (Mokhtari و همکاران، ۲۰۱۵). وظیفه مهم این آنزیم کمک در

جدول ۵- اثر استفاده از گیاهان دارویی سیاه‌دانه و گشنیز در جیره بر هاب فراسنجه‌های بیوشیمیایی و آنزیم‌های کبدی خون
Table 5. The effect of *nigella sativa* and coriander medicinal plants in the diet of lambs on biochemical parameters and liver enzymes of the blood

P value	SEM	گروه‌های آزمایشی (Experimental treatments)			فراسنجه (Parameter)
		3	2	1	
0.05	1.513	75.12 ^{ab}	75.63 ^a	69.69 ^b	گلوکز (ملی گرم در دسی لیتر) (Glucose)
0.05	1.307	33.14 ^b	38.05 ^a	38.56 ^a	نیترژن اوره‌ای خون (ملی گرم در دسی لیتر) (Blood urea nitrogen)
0.16	1.225	27.88	31.13	30.65	تری‌گلیسرید (میلی گرم در دسی لیتر) (Triglyceride)
0.05	2.124	66.14 ^{ab}	60.96 ^b	69.10 ^a	کلسترول (میلی گرم در دسی لیتر) (Cholesterol)
0.05	0.113	1.34 ^a	0.95 ^b	1.35 ^a	کراتینین (میلی گرم در دسی لیتر) (Creatinine)
0.22	0.357	8.48	8.33	8.62	پروتئین کل (گرم در دسی لیتر) (Total protein)
0.05	0.163	3.84 ^b	4.46 ^a	3.82 ^b	آلبومین (گرم در دسی لیتر) (Albumin)
0.79	0.245	4.64	3.87	4.80	گلوبولین (گرم در دسی لیتر) (Globuline)
0.97	0.039	0.83	0.83	0.82	نسبت آلبومین به گلوبولین (Globulin/Albumin)
0.01	1.660	63.42 ^c	73.20 ^a	68.72 ^b	آنزیم آسپاراتات آمینوترانسفراز (واحد در لیتر) (AST)
0.72	0.655	10.98	11.68	11.58	آنزیم آلانین آمینوترانسفراز (واحد در لیتر) (ALT)

^{a,b} تفاوت میانگین‌ها با حروف نا مشابه در هر ردیف معنی‌دار است ($P < 0.05$).

^۱ گروه شاهد: جیره پایه (بدون مکمل گیاهی)؛ ۲ = جیره پایه + ۲۰ گرم مخلوط سیاه‌دانه، (۳۰ درصد) و گشنیز (۷۰ درصد)؛ ۳ = جیره پایه + ۲۰ گرم مخلوط سیاه‌دانه (۷۰ درصد) و گشنیز (۳۰ درصد)

SEM = خطای معیار میانگین

the difference between means with different letters in each row is significant ($P > 0.05$).

¹ = Control treatment: basic diet (without herbal supplement); ² = first treatment: basal diet + 20 g of mixture of *nigella sativa* and coriander seeds of 30 and 70 percent; ³ = second treatment: basal diet + 20 g of *nigella sativa* and coriander seeds mixture, 70% and 30%, respectively.

SEM = Standard Error of the Mean

AST= Aspartate aminotransferase, ALT= Alanine aminotransferase

نتیجه‌گیری

آنزیم‌های کبدی شد و تأثیر سوء بر بقیه فراسنجه‌های خون نداشت. پیشنهاد می‌شود مطالعات بیشتری روی اثرات مخلوط گیاهان دارویی سیاه‌دانه و گشنیز با نسبت‌های مختلف بر هاب‌های نژاد غلجائی سبب بهبود عملکرد و بعضی فراسنجه‌های بیوشیمیایی و میکروبی محیط شکمبه انجام شود.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که افزودن ۲۰ گرم در روز مخلوط گیاه سیاه‌دانه و گشنیز با نسبت‌های مختلف به جیره بره‌های نژاد غلجائی سبب بهبود عملکرد و بعضی فراسنجه‌های بیوشیمیایی و میکروبی محیط شکمبه انجام شود.

منابع

- AOAC. (1990). Official Methods of Analysis, 17th edition. Association of official analytical chemists, Arlington, VA.
- Abdullah, M. A. M., & Farghaly, M. M. (2019). Impact of partial replacement of cottonseed meal by *nigella sativa* meal on nutrients digestibility, rumen fermentation, blood parameters, growth performance of growing lambs. *Egyptian Journal of Nutrition and Feeds*, 22 (2): 11-20. <https://doi.org/10.21608/ejnf.2019.102283>
- Abd El-Halim, M. I., El-Bagir, N. M., & Sabahelkhier, M. K. (2014). Hematological values in sheep fed a diet containing black cumin (*Nigella sativa*) seed oil. *International Journal of Biochemistry Research & Review*, 4 (2):128-140. <https://doi.org/10.9734/IJBCRR%2F2014%2F7382>.

- Al-dain, Q. Z. S., & Jarjeis, E. A. (2015). Evaluation of using some medical herbs seeds as feed additive on some hematological and biochemical parameters for male awassi lambs under local environmental condition of nineveh province, IRAQ. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 9(20): 527-537.
- Abdullah, M. A. M., & Farghaly, M. M. (2019). Impact of partial replacement of cottonseed meal by *nigella sativa* meal on nutrients digestibility, rumen fermentation, blood parameters, growth performance of growing lambs. *Egyptian Journal of Nutrition and Feeds*., 22(2), 11-20. <https://doi.org/10.21608/EJNF.2019.102283>.
- Abass, E.R., Almaamory, Y.A., & Sundos, F.M. (2020). Effect of adding coriander (*Coriandrum sativum*) powder to the diet in the rumen bacterial count and some blood parameters in Awassi ewes. *Plant Archives*., 20(1): 1686-1688.
- Allam, S., & El-Elaim, R. R. (2020). Impact of garlic, lemongrass, peppermint and rosemary as feed additives on performance of growing barki lambs. *Egyptian Journal of Nutrition and Feeds*., 23(3): 359-367. <https://doi.org/10.21608/ejnf.2020.148117>.
- Alfaro, G.F., Rodriguez-Zas, S.L., Southey, B.R., Muntifering, R.B., Rodning, S.P., Pacheco, W.J., & Moisés, S.J. (2021). Complete blood count analysis on beef cattle exposed to fescue toxicity and rumen-protected niacin supplementation. *Animals*., 11(4): 988-1003. <https://doi.org/10.3390/ani11040988>.
- Baxevanis, C. N., Goulielmaki, M., Adamaki, M., & Fortis, S. P. (2022). The thin red line between the immune system and cancer evolution. *Translational Oncology*., 27: 101555. <https://doi.org/10.1016/j.tranon.2022.101555>.
- Charkhi, W., Hozhabri, F., & Hajarian, H. (2023). Growth performance, hematology and blood biochemical constituents and antioxidant status of Roman lambs fed diets supplemented with mixture of cumin, coriander and peppermint powders. *Iranian Journal of Animal Science*., <https://doi.org/10.22059/ijas.2023.356573.653942>. [In persian]
- Charkhi, W., Hozhabri, F., & Hajarian, H. (2024). Incorporation of a mixture of cumin, coriander, and peppermint to the diet of Roman dairy ewes and its effect on performance and blood parameters of suckling lambs. *Animal Production*., 26(1), 15-31. <https://doi.org/10.22059/jap.2024.366169.623762>. [In persian]
- Elfaki, M. O., & Elkhair, N. M. (2023). Effect of *Nigella sativa* Seed Supplementation on Hematology, Acid-base Parameters, and Serum Biochemical Parameters in Nubian Goat Fed an Aflatoxin Contaminated Diet. *Cluj Veterinary Journal*., 28(2): 2-12. <https://doi.org/10.52331/cvj.v28i2.48>.
- Farhoudi, R., & Modhej, A. (2018). Effect of drought stress on seed yield, essential oil yield and ability of reactive oxygen species scavenging in *Nigella sativa* L. ecotypes. *Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research*., 34(3): 510-526. <https://doi.org/10.22092/ijmapr.2018.116805.2224>. [Inpersian]
- Farghaly, M. M., & Abdullah, M. A. M. (2021). Effect of dietary oregano, rosemary, and peppermint as feed additives on nutrients digestibility, rumen fermentation and performance of fattening sheep. *Egyptian Journal of Nutrition and Feeds*., 24(3): 365-376. <https://doi.org/10.1007/10.21608/EJNF.2021.210838>.
- Gassmann, M., Mairbäurl, H., Livshits, L., Seide, S., Hackbusch, M., Malczyk, M., & Muckenthaler, M. U. (2019). The Increase in Hemoglobin Concentration with Altitude Varies Among Human Populations. *Annals of The New York Academy of Sciences*., 1450(1): 204-220. <https://doi.org/10.1111/nyas.14136>.
- Hashemi, S. H. (2016). A Survey of Sort Production and Wool Processing in Afghanistan, Master's Thesis, *Kabul University*., pp. 31-32.
- Jae, S. Y., Kurl, S., Laukkanen, J. A., Heffernan, K. S., Choo, J., Choi, Y. H., & Park, J. B. (2014). Higher blood hematocrit predicts hypertension in men. *Journal of hypertension*., 32(2): 245-250. <https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000000029>.
- Jami, Y. E., Foroughi, A., Soleimani, A., Kazemi, M., Shamsabadi, V., & Torbaghan, A. E. (2015). The effect of substituting wheat straw with different levels of cumin (*Cuminum cyminum*) crop residues on growth, blood metabolites and hematological values of Moghani

- male lambs. *International Journal of Biosciences*., 6(12): 35-42. <http://dx.doi.org/10.12692/ijb/6.12.35-42>.
- Khattab, H. M., El-Basiony, A. Z., Hamdy, S. M., & Marwan, A. A. (2011). Immune response and productive performance of dairy buffaloes and their offspring supplemented with black seed oil. *Iranian Journal of Applied Animal Science*., 1 (4): 227-234.
- Kaki, S., Moeini, M. M., Hozhabri, F., & Nikousefat, Z. (2018). The use of crushed caraway (*Carum carvi*) and black seed (*Nigella sativa*) additives on growth performance, antioxidant status, serum components and physiological responses of Sanjabi lambs. *Iranian Journal of Applied Animal Science*., 8(3): 439-444.
- Khamisabadi, H., & Ahmadpanah, J. (2020). The effect of diets supplemented with *Coriandrum sativum* seeds on carcass performance, immune system, blood metabolites, rumen parameters and meat quality of lambs. *Acta Scientiarum. Animal Sciences*., 43, e52048. <https://doi.org/10.4025/actascianimsci.v43i1.52048>.
- Kholif, A. E., & Olafadehan, O. A. (2021). Essential oils and *phytogenic* feed additives in ruminant diet: chemistry, ruminal microbiota and fermentation, feed utilization and productive performance. *Photochemistry Reviews*., 1-22. <https://doi.org/10.1007/s11101-021-09739-3>.
- Karimi, Y., Norouzian, M. A., & Afzalzadeh, A. (2021). Effects of replacing soybean meal by black seed meal on blood parameters, nutrients digestibility, performance and carcass characteristics of Zandi fattening lambs. *Iranian Journal of animal Science*., 52(2): 109-115. DOI: 10.22059/ijas.2021.319554.653816. [Inpersian]
- Kuralkar, P., & Kuralkar, S. V. (2021). Role of herbal products in animal production—An updated review. *Journal of Ethnopharmacology*., 278: 114246. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2021.114246>.
- Makkar, H. P. S., Blümmel, M., & Becker, K. (1995). In vitro effects of and interactions between tannins and saponins and fate of saponins tannins in the rumen. *Journal of the Science of Food and Agriculture*., 69: 481–493. <https://doi.org/10.1002/jsfa.2740690413>.
- Matloup, O. H., Abd El Tawab, A. M., Hassan, A. A., Hadhoud, F. I., Khattab, M. S. A., Khalel, M. S., Salam, S. M. A., & Kholif, A. E. (2017). Performance of lactating Friesian cows fed a diet supplemented with coriander oil: feed intake, nutrient digestibility, ruminal fermentation, blood chemistry, and milk production. *Animal Feed Science and Technology*., 226: 88-97. <https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2017.02.012>.
- Mohammed, S. F., Saeed, A. A., Al-Jubori, O. S., & Saeed, A. A. (2018). Effect of daily supplement of coriander seeds powder on weight gain, rumen fermentation, digestion, and some blood characteristics of Awassi ewes. *Journal of Research in Ecology*., 6(2): 1762-1770.
- Mirzaei Cheshmehgachi, S., Moeini, M. M., & Khamisabadi, H. (2021). Effect of adding *Foeniculum vulgare* and black cumin (*Nigella sativa*) in the diet before and after lambing on blood metabolites and antioxidant status of Sanjabi ewes and their lambs. *Animal Production Research*., 9(4): 81-94. <https://doi.org/10.22124/ar.2019.12641.1391>. [In persian]
- McPherson, R. A., & Pincus, M. R. (2021). Henry's clinical diagnosis and management by laboratory methods E-book. *Elsevier Health Sciences*.
- Modi, C. P., Patil, S. S., Pawar, M. M., Chaudhari, A. B., Chauhan, H. D., & Ashwar, B. K. (2022). Effect of cumin (*Cuminum cyminum*) seed supplementation on production performance, nutrient digestibility and haemato-biochemical profile of Mehsana goats. *Indian Journal of Animal Sciences*., 92(7): 887-891. <https://doi.org/10.56093/ijans.v92i7.119705>.
- Navaei, a., Mousavi, s. M., & Taghizadeh, M. (2020). The effect of cumin and fennel powder in comparison with Monessen on oxidative stress in fattening lambs under thermal stress conditions. *Veterinary researches and biological products*., 33(4): 132-141. <https://doi.org/10.22092/vj.2019.127073.1600>. [In persian]

- Ohnson, A. M., Rohlf, E. M., & Silverman, L. M., (1999). Proteins. In: C.A. Burtis & E. R. Ashwood (Eds.) , Textbook of clinical chemistry. (pp. 477-540). Philadelphia:, W.B Saunders Company.
- Obeidat, B. S. (2020). The inclusion of black cumin meal improves growth performance of growing Awassi lambs. *Veterinary Sciences*:, 7(2):40. <https://doi.org/10.3390/vetsci7020040>.
- Patil, A. K., Baghel, R. P. S., Nayak, S., Malapure, C. D., Govil, K., Kumar, D., & Yadav, P. K. (2017). Cumin (*Cuminum cyminum*): As a feed additive for livestock. *Journal of Entomology and Zoology Studies*:, 5(3), 365-369.
- Retnani, Y., Wiryawan, K. G., Khotijah, L., Barkah, N. N., Gustian, R. A., & Dermawan, I. R. (2019). Growth performance, blood metabolites and nitrogen utilization of lambs fed with *nigella sativa* meal. *Pakistan Journal of Nutrition*:, 18 (3): 247-253. <https://doi.org/10.3923/pjn.2019.247.253>.
- Roshani, B., Norouzian, M. A., & Afzalzadeh, A. (2021). Nutrient digestibility, performance, carcass characteristics and blood parameters of fattening Zandi lambs fed by different levels of black seed (*Nigella sativa*) meal. *Animal Production*:, 23(1): 13-20. <https://doi.org/10.22059/jap.2020.300415.623522>. [In persian]
- Shams Al-dain Q. Z. & Jarjeis, E. A. (2015). Evaluation of using some Medical Herbs Seeds as Feed Additive on some Hematological and Biochemical Parameters for Male Awassi Lambs Under Local Environmental Condition of Nineveh Province, IRAQ. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*:, 9(20): 527-537.
- Shakeri, F., Soukhtanloo, M., & Boskabady, M. H. (2017). The effect of hydro-ethanolic extract of curcuma longa rhizome and curcumin on total and differential WBC and serum oxidant, antioxidant biomarkers in rat model of asthma. *Iranian Journal of Basic Medical Sciences*:, 20(2): 155. <https://doi.org/10.22038%2Fijbms.2017.8241>.
- Shaaban, H. A. (2020). Essential oil as antimicrobial agents: efficacy, stability, and safety issues for food application. In: M. S. de Oliveira, W. A. da Costa and S. G. Silva, Essential oils-bioactive compounds, new perspectives and applications:, 1-33.<https://doi.org/10.5772/intechopen.92305>.
- Saeed, M., Khan, M. S., Alagawany, M., Farag, M. R., Alqaisi, O., Aqib, A. I., & Ramadan, M. F. (2021). Clove (*Syzygium aromaticum*) and its phytochemicals in ruminant feed: an updated review. *Rendiconti lincei. Scienze fisiche e naturali*:, 32: 273-285. <https://doi.org/10.1007/s12210-021-00985-3>.
- Van Soest, P. J., Robertson, J. B., & Lewis, B. A. (1991). Methods of dietary fiber, neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. *Journal of Dairy Science*:, 74: 3583-3597. [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(91\)78551-2](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(91)78551-2).
- Vakili, A. R., Khorrami, B., Mesgaran, M. D., & Parand, E. (2013). The effects of thyme and cinnamon essential oils on performance, rumen fermentation and blood metabolites in Holstein calves consuming high concentrate diet. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*:, 26(7): 935. <https://doi.org/10.5713%2Fajas.2012.12636>.
- Yaghubi, N., Taghizadeh, A., & Janmohammadi, H. (2019). The effect of bioherbal on performance, digestibility, blood parameters and in vitro gas production of diet in Holstein fattening calves. *Journal of Ruminant Research*:, 7 (1): 77-90.<https://doi.org/10.22069/ejrr.2019.15777.1658>. [In Persian]
- Yamada, S., Yoshihisa, A., Kaneshiro, T., Amami, K., Hijioka, N., Oikawa, M., & Takeishi, Y. (2020). The relationship between red cell distribution width and cardiac autonomic function in heart failure. *Journal of Arrhythmia*:, 36 (6): 1076-1082. <https://doi.org/10.1002/joa3.12442>.
- Yavari, A., Moeini, M. M., & Hozhabri, F. (2022). Effect of black cumin and black seed on growth, weight gain, and blood parameters of fattening lambs under rangeland grazing condition. *Animal Production Research*:,10 (4): 49-59. <https://doi.org/10.22124/AR.2022.16793.1536>. [In Persian]